

予防接種の種類		接種対象月齢・年齢	接種開始の月齢・年齢	接種回数	接種間隔・注意事項等
ヒブ Hib感染症  (望ましい接種時期 生後2～7か月になる1日前)	接種開始月(年齢による) 接種回数が異なります	生後2か月～5歳の 誕生日の1日前	生後2～7か月 になる1日前	4回	・初回接種：27日以上の間隔(27～56日までが望ましい)で、1歳の誕生日の1日前までに3回接種 ・追加接種：3回目接種後7か月以上あけて(13か月までが望ましい)1回接種
			生後7か月～1歳の 誕生日の1日前	3回	・初回接種：27日以上の間隔(27～56日までが望ましい)で、1歳の誕生日の1日前までに2回接種 ・追加接種：2回目接種後7か月以上あけて(13か月までが望ましい)1回接種
			1～5歳の 誕生日の1日前	1回	・1回接種
小児の肺炎球菌感染症  (望ましい接種時期 生後2～7か月になる1日前)		生後2か月～5歳の 誕生日の1日前	生後2～7か月 になる1日前	4回	・初回接種：27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1日前まで(生後12か月までが望ましい)に3回接種 ・追加接種：3回目接種後60日以上あけて、1歳になってから(1歳3か月までが望ましい)1回接種
			生後7か月～1歳の 誕生日の1日前	3回	・初回接種：27日以上の間隔で、2歳の誕生日の1日前まで(生後13か月までが望ましい)に2回接種 ・追加接種：2回目接種後60日以上あけて、1歳になってから1回接種
			1～2歳の 誕生日の1日前	2回	・60日以上の間隔で2回接種
			2～5歳の 誕生日の1日前	1回	・1回接種
子					
予防接種の種類		接種対象月齢・年齢	望ましい接種期間	接種回数	接種間隔・注意事項等
結核(BCG)		生後～1歳の誕生日の1日前	生後5～8か月 になる1日前	1回	
百日せき・ジフテリア・ 破傷風・不活化ポリオ混合 ⇒4種混合(DPT-IPV)	第1期	生後3か月～ 7歳6か月になる1日前	生後3か月～ 1歳の誕生日の1日前	4回	・初回接種：20日以上の間隔(20～56日までが望ましい)で3回接種
			右記のとおり		・追加接種：3回目終了後、6か月以上あけて(1年～1年半後が望ましい)1回接種
※ポリオ(生、不活化)と、DPTのどちらも接種していない人が対象です。					
不活化ポリオ(IPV)	第1期	生後3か月～ 7歳6か月になる1日前	生後3か月～ 1歳の誕生日の1日前	4回	・初回接種：20日以上の間隔(20～56日までが望ましい)で3回接種
			右記のとおり		・追加接種：3回目終了後、6か月以上あけて(1年～1年半後が望ましい)1回接種
百日せき・ジフテリア・ 破傷風混合 ⇒3種混合(DPT) または、 ジフテリア・破傷風混合 (DT)	第1期	生後3か月～ 7歳6か月になる1日前	生後3か月～ 1歳の誕生日の1日前	4回 または、 3回	●3種混合(DPT)の場合 ・初回接種：20日以上の間隔(20～56日までが望ましい)で3回接種 ●DTの場合 ・初回接種：20日以上の間隔で2回接種
			右記のとおり		●3種混合(DPT)およびDTの場合 ・追加接種：3回目(DTは2回目)終了後、6か月以上あけて(1年～1年半後が望ましい)1回接種
ジフテリア・破傷風混合(DT)	第2期	11～13歳の誕生日の1日前	小学6年生	1回	
水痘		1～3歳の誕生日の1日前	1～3歳の 誕生日の1日前	2回	・1回目接種後3か月以上あけて(6月～1年が望ましい)2回目を接種。過去に任意で接種している場合、その回数分は市の補助対象外となります。
麻しん風しん混合(MR)	第1期	1～2歳の誕生日の1日前		1回	・麻しん(はしか)、風しんのいずれかにかかった場合でも、混合ワクチンで接種が可能です。
	第2期	平成21年4月2日生～ 平成22年4月1日生		1回	
日本脳炎	第1期	生後6か月～ 7歳6か月になる1日前	3歳	3回	・初回接種：6日以上の間隔(6～28日が望ましい)で2回接種
			4歳		・追加接種：2回目終了後6か月以上あけて(約1年後が望ましい)1回接種
	第2期	9～13歳の誕生日の1日前	小学4年生	1回	※平成7年4月2日～平成19年4月1日生の人は、20歳の誕生日の1日前までの間、必要な回数分(第1期、第2期)の接種が可能です。ただし、第2期は9歳からです。
ヒトパピローマウイルス 感染症 (子宮頸がん予防：HPV)		小学6年生～高校1年生相当の女性 (平成11年4月2日生～ 平成16年4月1日生の女性)	中学1年生の女性	3回	●サーバリックスの場合 ・1か月以上あけて2回目接種、1回目の接種から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目接種 ●ガーダシルの場合 ・1か月以上あけて(2か月が望ましい)2回目接種、3回目は2回目の接種から3か月以上あけて(1回目から6か月あけるのが望ましい)接種 ※現在、接種を積極的に勧めていません。 詳しくは、市のホームページをご覧ください。